

CALCUSAN® BEBE POMADA

VITAMINA A 600.000 U. I.

ÁCIDO BÓRICO 2 gramos

ÓXIDO DE ZINC 15 gramos

ACCIÓN:

CALCUSAN BEBÉ posee acción cicatrizante, antiséptica, regeneradora y protectora de la piel.

PARA QUÉ SE USA CALCUSAN BEBÉ:

CALCUSAN BEBÉ se utiliza especialmente para la dermatitis del pañal, grietas del pezón, eczemas, quemaduras y quemaduras de sol.

CÓMO SE USA CALCUSAN BEBÉ:

En caso de dermatitis del pañal o para la higiene del bebé: después de lavar cuidadosamente la piel del bebé, a continuación aplique CALCUSAN BEBÉ hasta cubrir totalmente el área a tratar.

Aplique CALCUSAN BEBÉ mediante suaves masajes para favorecer y facilitar la absorción por la piel. Utilice CALCUSAN BEBÉ en cada cambio del pañal hasta la completa curación de los síntomas.

En casos de grietas del pezón, eczemas, quemaduras o quemaduras solares: aplique suavemente dos o tres veces por día en el área afectada hasta la completa recuperación de la piel.

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR CALCUSAN BEBÉ:

No use este medicamento si Usted

sabe que es alérgico a alguno de sus componentes.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO:

CALCUSAN BEBÉ está destinado exclusivamente para su aplicación sobre la piel, no aplique en los ojos.

En caso de aplicación directa sobre piel dañada, puede producir una irritación momentánea.

En afecciones severas el tratamiento puede requerir utilizar medicamentos específicos por vía oral, los que deberán ser prescritos por un médico.

En caso de tratamientos prolongados consulte a su médico.

Dada la sensibilidad particular de la piel del bebé o si las lesiones son muy extensas, se deben evitar las compresas, la cobertura parcial o total con materiales impermeables o el exceso de aplicaciones ya que se pueden presentar efectos de sobredosificación por reabsorción de la vitamina A, debiendo considerar más precauciones con los recién nacidos.

Debe tenerse en cuenta que en caso de uso prolongado y de aplicación en zonas muy dañadas y extensas, no puede descartarse la aparición

de síntomas de hipervitaminosis como se observa al administrar vitamina A en forma oral, que puede manifestarse con náuseas, vómitos, prurito o descamación.

Especialmente en mujeres embarazadas y en niños menores de un año de edad, debe usarse con precaución dado que luego de la administración oral a niños de altas dosis de Vitamina A, se han observado casos de aumento de la presión intracraneal, papiledema, zumbido en los oídos o trastornos visuales, que desaparecieron al suspender el tratamiento.

Si Usted está utilizando algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Habitualmente no produce efectos adversos, pero en pacientes particularmente sensibles muy esporádicamente se ha presentado eczema de contacto.

CALCUSAN BEBÉ está destinado exclusivamente para ser aplicado sobre la piel.

No se han reportado casos en que haya habido sobredosis no tratada.

CALCUSAN® BEBE POMADA

VITAMINA A 600.000 U. I.
ÁCIDO BÓRICO 2 gramos
ÓXIDO DE ZINC 15 gramos

En caso de ingestión accidental o manifestaciones que hagan suponer la posibilidad de sobredosificación, llame por teléfono a un centro de intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros toxicológicos:

Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
Gallo 1330, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos: (011) 4962-6666 / 2247.

Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, U.B.A.:
Paraguay 2155, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: (011) 5950-9500.

Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas:
Presidente Illia 999, Haedo.
Teléfonos: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Niños de La Plata:
Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.
Teléfonos: 0800 222-9911 ó
(0221) 451-5555.

TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA:

(011) 4304-4524 y líneas rotativas
ANMAT Responde: 0800 333 1234

Última revisión del prospecto
aprobada por A.N.M.A.T.: Julio 2014

PRESENTACIONES:

Pomos conteniendo 50 gramos.
Venta libre. Industria Argentina

Medicamento autorizado
por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 47.359.
Directora Técnica:
Farmacéutica Filomena Freire.

Conservar a temperaturas entre 5°C
y 30 °C.

Si el cierre de seguridad está abierto
no use este medicamento.

Mantener fuera del alcance de los
niños

Ante cualquier duda consulte a su
médico y/o a su farmacéutico.

Laboratorios MONSERRAT Y ECLAIR S. A.

Virrey Cevallos 1623/25/27
C1135AAI Ciudad de Buenos Aires

Teléfonos y Fax:
(011) 4304-4524 y líneas rotativas



CALCUSAN® BEBE POMADA

M&E

VITAMINA A 600.000 U. I. - ÁCIDO BÓRICO 2 gramos - ÓXIDO DE ZINC 15 gramos

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR

Eficacia y seguridad para recomendar

Cada 100 gramos contiene

QUÉ CONTIENE

CALCUSAN BEBÉ

Vitamina A 600.000 U. I. (como palmitato)

Ácido bórico 2 gramos

Óxido de zinc 15 gramos

Excipientes: aceite de hígado de bacalao, talco, cloruro de bencetonio, lanolina, cetomacrogol 1000, vaselina sólida, vainillina, sílicona DC 5200, BHT, BHA, agua purificada c.s.p. 100 g.