

CALCUSAN X POLVO

ÓXIDO DE ZINC - UNDECILENATO DE ZINC - BENTONITA
PROPIONATO DE SODIO - ÁCIDO SALICÍLICO

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Cicatrizante, antiinflamatorio, antimicrobiano, antimicótico, epitelizador.

INDICACIONES

Heridas accidentales y post-quirúrgicas. Excoriaciones débiles. Quemaduras. Escaras por decúbito. Úlceras por decúbito. Úlceras varicosas. Dermatitis por contacto. Dermatitis del pañal. Eritema del pañal. Prurito. Dermatofitosis. Dermatomiosicosis. Balanopostitis. Intertrigos de los pliegues en lactantes, niños y adultos.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

CALCUSAN X POLVO proporciona una acción astringente que disminuye el prurito y el ardor a través de un efecto secante y refrescante. Es fungicida. Actúa como antiséptico creando un medio desfavorable para el crecimiento bacteriano. Estimula la regeneración de la capa córnea y contribuye a normalizar la queratinización defectuosa.

POSOLOGÍA – MODO DE ADMINISTRACIÓN

Producto medicinal para USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE.

Quemaduras, heridas profundas:

El profesional actuante indicará la modalidad y frecuencia de uso de acuerdo con la magnitud de la lesión.

Heridas superficiales, micosis, úlceras por decúbito y excoriaciones leves:

Aplicar 2 o 3 veces por día espolvoreando la zona afectada, que deberá ser previamente higienizada y secada.

Dermatitis y eritema del pañal:

Espolvorear sobre la piel limpia y seca después de cada cambio de pañal, especialmente en la noche, cuando los cambios pueden ser menos frecuentes.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algún componente de la fórmula.

ADVERTENCIAS

Este medicamento es para USO EXTERNO exclusivamente. Evitar el contacto del producto con los ojos. Antes de su apli-

cación deben lavarse y secarse bien las zonas de la piel a tratar, así como también las zonas circundantes a ellas.

PRECAUCIONES

Si la curación quedara adherida a vendajes o apósitos, estos deben retirarse cuidadosamente, humedeciéndolos con agua tibia previamente hervida, con el fin de que se desprendan fácilmente sin arrastrar tejido.

Embarazo/Lactancia:

No se han descripto problemas en humanos.

Interacciones:

El uso concomitante del producto con preparados tópicos que poseen en su fórmula tretinoína, resorcinol, peróxido de benzoilo y/o alcohol puede causar una irritación localizada.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente puede causar sequedad de la piel.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingesta accidental, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital Prof. Dr. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 y 4658-7777

PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 50 g.

MODO DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar dentro de su envase original, cerrado, con su estuche y a temperatura ambiente, preferentemente entre 15 °C y 30 °C.

Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 57.980

Directora Técnica: Farmacéutica Filomena Freire

Venta bajo receta. Industria Argentina. Uso externo.

Elaborado en: Galicia 2652, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha de última revisión del prospecto: 30 / Junio / 2016

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S. A.

Virrey Cevallos 1623/25/27

C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas.

CALCUSAN® X POLVO



M&E

ÓXIDO DE ZINC - UNDECILENATO DE ZINC - PROPIONATO DE SODIO - ÁCIDO SALICÍLICO - BENTONITA

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR

Eficacia y seguridad para recomendar

COMPOSICIÓN CUALICUANTITATIVA:

Cada 100 g de polvo contiene:

Óxido de zinc 20 g

Undecilenato de zinc 10 g

Propionato de sodio 3 g

Ácido salicílico 0,6 g

Excipientes:
Bentonita, Miglyol 812, m-cresol,
metilparabeno, propilparabeno.

CALCUSAN X POLVO

ÓXIDO DE ZINC - UNDECILENATO DE ZINC - BENTONITA
PROPIONATO DE SODIO - ÁCIDO SALICÍLICO

FÓRMULA:

Cada 100 g de polvo contiene:

Óxido de zinc 20 g, Undecilenato de zinc 10 g, Propionato de sodio 3 g, Ácido salicílico 0,6 g.

Excipientes: Bentonita, Miglyol 812, m-cresol, metilparabeno, propilparabeno, c.s.

CONSULTE A SU MÉDICO. ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO:

Lea detenidamente esta información y consérvela por si necesita volver a leerla.

Alergias: informe a su médico si Usted alguna vez tuvo una reacción alérgica.

Embarazo: consulte a su médico.

Lactancia: consulte a su médico.

Niños: consulte a su médico.

Ancianos: no se conocen diferentes efectos adversos o problemas en adultos mayores comparados con los adultos jóvenes.

Otros medicamentos: el uso concomitante con otros medicamentos puede provocar una interacción. En estos casos, su médico puede cambiar la dosis o tomar otras precauciones de ser necesario. Informe a su médico si Usted está tomando algún medicamento.

Enfermedades concomitantes: la presencia de otras enfermedades puede afectar el uso de este producto. Asegúrese de informar a su médico si tiene alguna otra enfermedad.

USO APROPIADO DEL MEDICAMENTO CÓMO ACTÚA CALCUSAN X

CALCUSAN X POLVO proporciona una acción astringente disminuyendo prurito y ardor a través de un efecto secante y refrescante.

Elimina los hongos. Actúa como antiséptico creando un medio desfavorable para el crecimiento de bacterias. Estimula la regeneración de la piel y contribuye a normalizar la cicatrización.

PARA QUÉ SE UTILIZA CALCUSAN X

CALCUSAN X está indicado en: Heridas accidentales y postquirúrgicas. Quemaduras. Excoriaciones débiles. Escaras por decúbito. Úlceras por decúbito. Úlceras varicosas. Dermatitis por contacto. Dermatitis del pañal. Eritema del pañal. Prurito. Dermatoftosis. Dermatomicosis. Balanopostitis. Intertrigos de los pliegues en lactantes, niños y adultos.

CÓMO DEBE SER USADO CALCUSAN X

Como con todo medicamento siga cuidadosamente las instrucciones de su médico para asegurarse que CALCUSAN X actúa correctamente. No debe ser administrado por vía oral: es un polvo de uso externo exclusivamente.

En quemaduras, heridas profundas: el médico indicará la modalidad y frecuencia de uso, de acuerdo con la magnitud de la lesión.

En heridas superficiales, micosis, úlceras por decúbito y en excoriaciones leves: aplicar 2 o 3 veces por día espolvoreando la zona afectada, que deberá ser previamente higienizada y secada.

En dermatitis y eritema del pañal: espolvorear sobre la piel limpia y seca después de cada cambio de pañal, especialmente en la noche, cuando los cambios pueden ser menos frecuentes.

¿Puede ser utilizado CALCUSAN X durante el embarazo o el período de lactancia? CALCUSAN X puede ser usado durante el embarazo o durante la lactancia con control de su médico.

¿Puede ser usado CALCUSAN X en los niños? CALCUSAN X puede ser usado en niños con control de su médico.

¿Puede ser usado CALCUSAN X en personas de edad avanzada? CALCUSAN X puede ser usado en personas de edad avanzada. Además de las precauciones generales de uso, no es necesario tomar precauciones especiales en estas personas.

MODO DE CONSERVACIÓN Cómo se debe almacenar CALCUSAN X

Conservar dentro de su envase original, cerrado, junto con su estuche y a temperatura ambiente, preferentemente entre 15 °C y 30 °C.

No utilice el producto después de la fecha de vencimiento que se indica en el envase.

EFFECTOS INDESEABLES

Cuándo no debe usarse CALCUSAN X: Si es alérgico y/o hipersensible a cualquiera de los componentes enumerados en el ítem "Fórmula".

Qué precauciones deben tomarse cuando se usa CALCUSAN X
Evitar el contacto del producto con los ojos.

Antes de su aplicación, deben lavarse y secarse bien las zonas de la piel a tratar, así como también las zonas circundantes a ellas.

Si la curación quedara adherida a vendajes o apósitos, éstos deben retirarse cuidadosamente humedeciéndolos con agua tibia previa-

Medicamento desarrollado por
Laboratorios Monserrat y Eclair S.A.

mente hervida, con el fin de que se desprendan fácilmente sin arrastrar tejido. Consulte regularmente a su médico.

QUÉ REACCIONES SECUNDARIAS PUEDE CAUSAR CALCUSAN X:

Generalmente CALCUSAN X es bien tolerado. Ocasionalmente puede causar sequedad de la piel.

¿Está tomando otros medicamentos?

Antes de utilizar CALCUSAN X consulte con su profesional de la salud si está tomando otro medicamento (tanto de prescripción médica como sin prescripción médica).

Este medicamento ha sido prescrito solo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE EL TIEMPO QUE UTILIZA ESTE MEDICAMENTO

No se aplique dosis mayores a las recomendadas.

El uso concomitante del producto con preparados tópicos que poseen en su fórmula tretinoína, resorcinol, peróxido de benzoilo y/o alcohol puede causar una irritación localizada.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234".

Fecha de la última revisión del prospecto autorizada por ANMAT: 30/Junio/2016

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 57.980 Dir. Técnica: Farmacéutica Filomena Freire. Elaborado en: Galicia 2652, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S. A.

Virrey Cevallos 1623/25/27

C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas