

## **REFENAX® JARABE**

BUTETAMATO - ETER GLICERIL GUAYACÓLICO  
PSEUDOEFEDRINA - CLORURO DE AMONIO

### **ACCIÓN TERAPÉUTICA:**

Expectorante, descongestivo, mucolítico, broncodilatador, broncoespasmolítico.

### **INDICACIONES:**

Tos de etiología diversa: aguda, crónica, seca. Catarro. Bronquitis espasmódica. Tos del fumador. Coadyuvante en el tratamiento de pacientes que han dejado de fumar. El tratamiento de afecciones broncopulmonares de origen bacteriano debe asociar medicación antiinfecciosa específica bajo estricto control médico.

### **ACCIÓN FARMACOLÓGICA:**

Debido a sus componentes expectorantes y mucolíticos, REFENAX Jarabe aumenta la secreción bronquial, fluidifica y disuelve su estructura filamentosa, reduce la viscosidad de las secreciones de tráquea y bronquios, facilitando su desprendimiento y expectoración.

REFENAX Jarabe favorece la motilidad de las cilias vibrátiles. La acción broncodilatadora y broncoespasmolítica del butetamato y la pseudoefedrina, presentes en REFENAX Jarabe mejora la ventilación pulmonar.

### **FARMACOCINÉTICA:**

Los componentes de REFENAX JARABE son rápidamente absorbidos en el tracto gastrointestinal, siendo eliminados por orina dentro de las 24 horas de su administración como metabolitos inactivos.

La pseudoefedrina se metaboliza parcialmente en el hígado y alrededor del 55 al 75% de la dosis ingerida se elimina por vía renal sin modificar.

### **POSOLOGÍA:**

**Niños de 3 a 6 años:** 3,5 ml tres a cuatro veces por día (una toma cada 6 a 8 horas).

**Niños de 6 a 12 años:** 5 ml tres a cuatro veces por día (una toma cada 6 a 8 horas).

**Adultos:** 7,5 ml 4 veces por día (una toma cada 6 horas).  
*Se acompaña vaso dosificador para una correcta dosificación.*

### **CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes. Embarazo. Lactancia. Angina de pecho. Glaucoma. Enfermedad coronaria y/o hipertensión severa. Enfermedad hepática o alcoholismo. Enfermedad renal severa.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Por su acción demulcente y protectora de la mucosa faríngea, REFENAX Jarabe se prepara con jarabe de azúcar. Los pacientes diabéticos deben considerar que la dosis correspondiente a un adulto contiene 3,75 g de azúcar, aproximadamente equivalente al contenido de azúcar de medio caramelo.

### **INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:**

Pueden producirse interacciones con depresores del sistema nervioso central tales como inhibidores de la monoaminoxidasa y antidepresivos tricíclicos. Debe evitarse la ingestión conjunta con digitálicos, antihipertensivos u otros medicamentos cardiovasculares, salvo bajo indicación y control médico.

### **REACCIONES ADVERSAS:**

REFENAX JARABE no contiene sustancias que depriman el centro respiratorio. Sin embargo, la pseudoefedrina, que en REFENAX Jarabe se encuentra en bajas concentraciones, en pacientes susceptibles muy ocasionalmente puede provocar: náuseas, vómitos, reducción del apetito, taquicardia, palpitaciones, hipertensión arterial, retención urinaria o insomnio, que desaparecen inmediatamente con la disminución de la dosificación o la suspensión del tratamiento.

## REFENAX® JARABE

BUTETAMATO - ETER GLICERIL GUAYACÓLICO  
PSEUDOEFEDRINA - CLORURO DE AMONIO

### **SOBREDOSIFICACIÓN:**

No se han informado casos de intoxicación por sobredosificación con REFENAX JARABE.

En caso de sobredosis accidental, consulte inmediatamente con un centro asistencial:

#### **Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:**

Gallo 1330, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.

#### **Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, U.B.A.:**

Paraguay 2155, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: (011) 5950-9500.

#### **Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas:**

Presidente Illia 999, Haedo.  
Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

#### **Hospital de Niños de La Plata:**

Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.  
Teléfonos: 0800 222 9911 / (0221) 451-5555.

Última revisión del prospecto aprobada por A.N.M.A.T.:  
Agosto / 1999

### **PRESENTACIÓN:**

Frasco conteniendo 120 ml.  
Venta bajo receta. Industria Argentina.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 27.460.

Directora Técnica: Farmacéutica Filomena Freire.

Conservar a menos de 30°C en su envase original.  
Mantener fuera del alcance de los niños.

#### **Laboratorios MONSERRAT Y ECLAIR S.A.**

Virrey Cevallos 1623/25/27  
C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas.

# REFENAX® JARABE



M&E

BUTETAMATO - ETER GLICERIL GUAYACÓLICO  
PSEUDOEFEDRINA - CLORURO DE AMONIO

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR  
Eficacia y seguridad para recomendar

### **FÓRMULA:**

Cada 100 ml contiene:

**Butetamato citrato** 0,10 g

**Eterglicerilguayacólico** 1 g

**Pseudoefedrina clorhidrato** 0,3 g

**Cloruro de amonio** 1 g

Excipientes: benzoato de sodio, citrato de sodio, esencia de durazno, extracto fluido de condurango, azúcar, esencia de naranjas dulces, esencia de menta, colorante rojo punzó 4R, propilenglicol, sacarina sódica, metilparabeno, propilparabeno, agua purificada c.s.p. 100 ml.



Medicamento Libre de Gluten