

IBUCLER® fem

IBUPROFENO 400 miligramos

METILBROMURO DE HOMATROPINA 4 miligramos

Comprimidos Recubiertos

QUÉ ACCIÓN TIENE IBUCLER FEM

Analgésico, antiinflamatorio y antiespasmódico.

PARA QUÉ SE USA IBUCLER FEM

IBUCLER FEM está indicado para el alivio de los espasmos dolorosos genitourinarios, dolores menstruales y premensuales y de cólicos o retortijones del aparato digestivo.

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUCLER FEM

No use este medicamento si Usted tiene:

- Alergia a alguno de los componentes de la fórmula.
- Miastenia gravis (enfermedad de los músculos).
- Megacolon (enfermedad del intestino grueso).
- Insuficiencia hepática y/o renal (funcionamiento inadecuado de su hígado y/o riñones).
- Antecedentes de úlcera de estómago o intestino, sangrado o perforaciones en aparato digestivo.
- Antecedentes de asma bronquial, pólipos nasales, angioedema (hinchazón de la cara, lengua o garganta), picazón o broncoespasmo inducido por fármacos del tipo de la aspirina y otros antiinflamatorios del grupo del ibuprofeno.
- Pérdida importante de líquido (vómitos, diarrea o tomar pocos líquidos).
- Insuficiencia del corazón grave.
- Colitis ulcerosa (inflamación del intestino con diarrea y dolor abdominal).
- Aumento de la presión ocular (glaucoma).
- Menores de 15 años de edad.
- Si Usted está tomando otros medicamentos para la inflamación y el dolor (por ejemplo aspirina) consulte a su médico antes de tomar IBUCLER FEM.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

- Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la menor dosis efectiva que calme los síntomas, por el tiempo más corto.
- Las personas de edad avanzada (mayores de 65 años) deben consultar con su médico antes de tomar este medicamento.
- Si Usted presenta además de dolor de vientre tipo cólico, náuseas, vómitos, diarrea y/o fiebre, no tome ninguna medicación y consulte con su médico.
- Si la persona que va a tomar la medicación tiene antecedentes de presión arterial alta o enfermedad del corazón, consulte con su médico antes de tomar este medicamento.
- Debe ser tomado con precaución en personas con taquicardia (aumento de la frecuencia cardíaca) u otros antecedentes de enfermedades del corazón.
- Si consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte con su médico antes de tomar este medicamento.
- Aunque el ibuprofeno tiene a veces los mismos usos que la aspirina y el paracetamol, no deben ser tomados juntos, excepto bajo supervisión médica.
- El ibuprofeno puede ocultar los signos de una infección (fiebre, dolor, inflamación).
- No usar este medicamento por más de 5 (cinco) días para el dolor.

Si Usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO

- Si el dolor de vientre o tipo cólico por el cual empezó a

tomar esta medicación, continúa por más de 2 o 3 días, o empeora, por ejemplo con náuseas, vómitos o fiebre, consulte con su médico inmediatamente.

- Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como por ejemplo: sequedad de la boca, aumento en la frecuencia cardíaca (taquicardia) y retención urinaria (dificultad para orinar).

ALGUNOS EFECTOS INDESEABLES DE ESTE MEDICAMENTO INCLUYEN:

- Alteraciones en la sangre (disminución de los glóbulos rojos y/o plaquetas).
- Alteraciones del sistema nervioso (depresión, insomnio, nerviosismo, confusión, irritabilidad, mareos, fatiga, dolor de cabeza).
- Alteraciones en la vista (problemas para enfocar la vista, visión borrosa y alteración de los colores), por lo que se recomienda precaución y evitar conducir vehículos u operar maquinarias peligrosas hasta que se normalice la visión.
- Alteraciones auditivas (disminución de la audición, zumbidos).
- Alteraciones cardíacas (aumento o disminución de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones).
- Alteraciones gastrointestinales (úlceras, sangrados, vómitos, diarrea o materia fecal con sangre, perforación, constipación, boca seca).
- Alteraciones del hígado (mal funcionamiento del hígado, aumento de las enzimas).
- Alteraciones de la piel (erupciones en la piel).
- Alteraciones renales (mal funcionamiento de los riñones, dificultad para orinar, retención de líquidos).

Si se presentan algunos de los efectos indeseables mencionados, se debe discontinuar el tratamiento con IBUCLER FEM.

IBUCLER® fem

IBUPROFENO 400 miligramos

METILBROMURO DE HOMATROPINA 4 miligramos

Comprimidos Recubiertos

SI SE ESTÁ TOMANDO ALGUNO DE ESTOS MEDICAMENTOS, CONSULTE CON SU MÉDICO:

Antidepresivos (ejemplo amitriptilina, imipramina, inhibidores de la recaptación de serotonina como fluoxetina, paroxetina).

Medicamentos para tratar la epilepsia: difenilhidantoína y fenitoína.

Tratamiento del trastorno bipolar maniaco-depresivo (litio).

Antivirales (amantadina).

Medicación para las náuseas (metoclopramida).

Medicación para el asma (salbutamol, clenbuterol).

Anticoagulantes orales (warfarina, metotrexato, tacrolimus -para trasplantes- o zidovudina -para HIV-).

CÓMO SE USA IBUCLER FEM

Mayores de 15 años: 1 comprimido cada 8 horas, durante los días que se presenten los síntomas dolorosos. Tome el medicamento preferentemente después de las comidas.

Dosis máxima 3 comprimidos por día.

No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor.

QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD QUE LA NECESARIA:

Concurra al centro más cercano de asistencia médica o comuníquese telefónicamente con un centro de intoxicaciones: (011) 4658-7777 ó (011) 4962-6666/2247 ó 0800 222 9911 / (0221) 451-5555

PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo 8 comprimidos.
Venta libre. Industria Argentina

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración.

No debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

Lea atentamente esta información y ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

Modo conservación: Conservar en un lugar seco y fresco a temperatura ambiente.

Tiene usted alguna pregunta: (011) 4304-4524
ó ANMAT Responde 0800 333 1234

Mantener fuera del alcance de los niños

Elaborado en: Galicia 2652, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección Técnica: Farmacéutica Filomena Freire.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 53.802

Fecha de la última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: Noviembre / 2014.

Laboratorios MONSERRAT Y ECLAIR S. A.

Virrey Cevallos 1623/25/27

C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas

IBUCLER® fem

COMPRI M I D O S R E C U B I E R T O S



M&E

IBUPROFENO - METILBROMURO DE HOMATROPINA

Analgésico, antiinflamatorio y antiespasmódico.

QUÉ CONTIENE IBUCLER FEM

FÓRMULA:

Cada comprimido contiene:

Ibuprofeno 400 miligramos

Metilbromuro de Homatropina 4 miligramos

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR

Eficacia y seguridad para recomendar

Excipientes: celulosa microcristalina PH 101, celulosa microcristalina PH 200, dióxido de silicio, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, hidroxipropilmetilcelulosa, polietilenglicol 6000, talco, dióxido de titanio, laca roja punzó 4 R, propilenglicol.



Medicamento Libre de Gluten