

PULMOCLER® JARABE

BROMHEXINA - BUTETAMATO

Lea con cuidado esta información antes de tomar este medicamento

ACCIÓN / ES

PULMOCLER Jarabe es mucolítico y expectorante.

PARA QUÉ SE USA PULMOCLER JARABE

Alivio de los síntomas del catarro bronquial y de la tos, por fluidificación del moco, facilitando la expectoración.

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR PULMOCLER JARABE

No use este medicamento si Usted sabe que:

- es alérgico a alguno de sus componentes
- padece úlcera gastroduodenal
- tiene dificultades para expectorar
- tiene asma
- tiene enfermedades del hígado o riñón o toma alcohol
- se encuentra en tratamiento con disulfiram
- No usar en niños menores de 12 años

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO

Consulte a su médico antes de ingerir este medicamento:

- si Usted está tomando simultáneamente algún medicamento, por ejemplo otros medicamentos para la tos.
- si va a ser usado por personas mayores de 65 años.
- considerando que durante este tratamiento es posible un aumento de las secreciones, puede no ser aconsejable en pacientes con dificultades para expectorar.

Si Usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO

Interrumpa el uso y consulte a su médico si presenta:

- Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.
- Reacciones alérgicas severas con compromiso respiratorio, angioedema, dificultad para respirar, caída de la presión arterial y choque anafiláctico.
- Reacciones alérgicas en la piel con picazón, edema, cambio de color (urticaria), ampollas (eritema multiforme), pústulas (PEGA), despegamiento de la piel y mucosas (SSJ / NET).
- Si los síntomas del catarro bronquial persisten por más de 2 días o empeoran consulte inmediatamente a su médico. No administrar este medicamento por más de 5 días.

CÓMO SE USA PULMOCLER JARABE

Niños mayores de 12 años y adultos: 10 ml (equivalente a una cucharada de postre) cada 8 horas. Se acompaña vaso dosificador para una correcta dosificación.

Si este medicamento le produjo algún EFECTO ADVERSO / NO DESEADO o NO CAUSÓ EFECTO, comuníquese con el A.N.M.A.T. mediante el FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN ON-LINE disponible en: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD QUE LA NECESARIA

Concurra al centro más cercano de asistencia médica o comuníquese telefónicamente con un centro de intoxicaciones:

Centros de intoxicaciones:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez

(011) 4962-6666 / 4962-2247

Hospital Prof. Dr. Alejandro Posadas

(011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández

(011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital de Niños de La Plata (0221) 451-5555

PULMOCLER® JARABE

BROMHEXINA - BUTETAMATO

TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA

(011) 4304-4524 ó ANMAT Responde 0800 333 1234

MODO DE CONSERVACIÓN

Conservar a menos de 30°C en su envase original.

PRESENTACIONES

Frascos conteniendo 120 ml.

Venta libre. Industria Argentina.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Dirección Técnica: Farmacéutica Filomena Freire.
Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 45.806

Fecha de la última revisión del prospecto autorizado
por la A.N.M.A.T.: Mayo 2018

*Un medicamento
de Monserrat y Eclair*

Laboratorios MONSERRAT Y ECLAIR S.A.

Virrey Cevallos 1623/25/27

C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas.

PULMOCLER® JARABE

SIN AZÚCAR



M&E

BROMHEXINA - BUTETAMATO

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR
Eficacia y seguridad para recomendar

QUÉ CONTIENE PULMOCLER JARABE

Cada 100 mililitros contiene:

Bromhexina clorhidrato 120 miligramos

Butetamato citrato 120 miligramos

Excipientes: metilparabeno, propilparabeno, pro-
pilénglico, rojo punzó 4 R, amarillo quinolina,
ácido cítrico anhidro, sabor tutti frutti, sacarina sódica,
sorbitol, agua purificada c.s.p. 100 ml.

PULMOCLER no contiene alcohol.

Medicamento Libre de Gluten

