



Kritel®



Chicles Laxantes
sin azúcar
Sabor
Menta Fresca

Qué contiene KRITEL • Cada chicle contiene:

PICOSULFATO DE SODIO 5 miligramos. Exc.: goma base, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, aspartame, acesulfame K, hidroxipropilmetilcelulosa E15, polietilenglicol 6000, talco, dióxido de titanio, sacarina sódica, sabor menta fresca, c.s.p. 1 chicle.

Acción: Laxante • Para qué se usa KRITEL: KRITEL está indicado para el alivio de los síntomas de constipación o estreñimiento, en tratamientos de corta duración, cuando las medidas higiénico-dietéticas han fracasado.

Cómo se usa KRITEL • Adultos: 1 a 2 chicles por la noche antes de acostarse.

Mascar KRITEL hasta formar el chicle y luego de unos minutos desecharlo. Actúa por la mañana al despertarse. Dosis máxima: 3 chicles por día. • No use este medicamento si Usted es alérgico a alguno de sus ingredientes o si tiene náuseas, vómitos, calambres, dolor de estómago o de la parte inferior del abdomen, que puedan indicar apendicitis u otros problemas que puedan requerir cirugía. • No debe tomar laxantes si sufre alguna enfermedad intestinal inflamatoria, si presenta un cuadro de obstrucción intestinal, dolor abdominal no diagnosticado, deshidratación grave o si observa sangre en la materia fecal. • Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento.

Qué personas no pueden recibir KRITEL: Niños menores de 12 años. Personas mayores de 65 años deben consultar a su médico antes de tomarlo. Si Usted recibe algún otro medicamento para alguna enfermedad crónica, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando este medicamento El uso prolongado de laxantes puede ocasionar una situación de dependencia al mismo. • Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como dolor abdominal de tipo cólico, malestar abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas. En todos los casos desaparecen al suspender el tratamiento. • Si Usted toma al mismo tiempo diuréticos, puede suceder que aumente el riesgo de desequilibrio electrolítico, es decir pérdida de agua y electrolitos por diarrea, por lo que debe consultar a su médico. • Suspenda su uso y consulte a su médico si la constipación persiste por más de 2 días o empeora.

Qué debo hacer ante una sobredosis o si tomé más cantidad que la necesaria: Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica. Centros de intoxicaciones: (011) 4658-7777 ó (011) 4962-6666/

Tiene usted alguna pregunta ANMAT Responde 0800-333-1234. Atención al Cliente: 011 - 3990 9099. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

Forma de conservación: Conservar en lugar fresco, a menos de 30 °C, al abrigo de la luz. • **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Elaborado en Galicia 2652, C.A.B.A. Dir. Técnica: Farm. Filomena Freire. E.M.A.M.S. Certificado N° 33.380. Fecha última revisión del prospecto autorizado por ANMAT: Agosto 2012. N° de Registro Sanitario en Bolivia: II-84754/2023 Importado y Distribuido en Bolivia por: Lab. ABD Ltda.

Laboratorios MONSERRAT Y ECLAIR S. A. Virrey Cevallos 1623/25/27 C1135AAI CABA, República Argentina. Tel.: (+54) 11 3990 9099

M&E

6 chicles Venta libre
Industria Argentina

