

## **KRITEL® EMULSIÓN**

PICOSULFATO DE SODIO - VASELINA LÍQUIDA

### **ACCIÓN TERAPÉUTICA:**

Laxante, lubricante intestinal.

### **INDICACIONES:**

Tratamiento sintomático de la constipación ocasional cuando las medidas higiénicas o dietéticas han fracasado.

### **POSOLOGÍA:**

Adultos y adolescentes mayores de 12 años:  
10 ml (una cucharada sopera) antes de acostarse.  
(10 ml = 5 mg de picosulfato de sodio).

Agite antes de cada toma.

### **CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

No utilizar en presencia de dolores gastrointestinales, vómitos o náuseas; oclusión intestinal o síndrome suboclusivo; síndromes dolorosos abdominales sin diagnóstico.

Pacientes con cuadros abdominales agudos (obstrucción intestinal). Colopatías orgánicas complementarias: enfermedad de crohn, rectocolitis ulcerosa.

### **EFFECTOS ADVERSOS:**

Puede presentarse malestar abdominal de tipo cólico o diarrea con pérdida de agua y electrolitos (especialmente potasio).

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Salvo expresa indicación médica no debe administrarse en forma prolongada ni a dosis superiores a las recomendadas. El tratamiento continuo no debe exceder los 5 días de ingesta.

Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no tome laxantes sin consultar a su médico.

Consulte a su médico si Usted está tomando medicamentos, diuréticos o medicación para el corazón (digitálicos).

Si los síntomas de constipación subsisten por más de 48 horas o empeoran, consulte con su médico.

### **EMBARAZO Y LACTANCIA:**

Si Usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

### **INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:**

Si Usted está tomando algún medicamento para alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de ingerir KRITEL Emulsión u otros laxantes.

### **SOBREDOSIFICACIÓN:**

En caso de ingestión accidental concurra al Hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:

#### ***Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:***

Gallo 1330, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfonos: (011) 4962-6666 / 2247.

#### ***Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, U.B.A.:***

Paraguay 2155, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Teléfono: (011) 5950-9500.

#### ***Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas:***

Presidente Illia 999, Haedo.  
Teléfonos: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

#### ***Hospital de Niños de La Plata:***

Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.  
Teléfonos: 0 800 222 9911 / (0221) 451-5555.

**KRITEL® EMULSIÓN**

PICOSULFATO DE SODIO - VASELINA LÍQUIDA

**PRESENTACIONES:**

KRITEL Emulsión sabor Vainilla

Frascos conteniendo 240 ml.

**OTRAS PRESENTACIONES:**

KRITEL Chicles Laxantes blister x 6

KRITEL Enema pomos x 135 ml

KRITEL Gotas frascos x 20 ml

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 42.450.

Venta libre. Industria Argentina.

Directora Técnica: Farmacéutica Filomena Freire.

Lea atentamente este prospecto y ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

Manténgase cerrado, en lugar fresco, a temperatura inferior a 30°C.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Última revisión del prospecto aprobada por A.N.M.A.T.: Mayo/2011

**Laboratorios MONSERRAT Y ECLAIR S.A.**

Virrey Cevallos 1623/25/27

C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas.

**KRITEL® EMULSIÓN**



**M&E**

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR

PICOSULFATO DE SODIO - VASELINA LÍQUIDA

*Eficacia y seguridad para recomendar*

**Fórmula:**

Cada 100 ml contiene:

**Picosulfato de Sodio** 0,05 g

**Vaselina** 28,225 g

Excipientes: avicel RC 591, metilparabeno, propilparabeno, polisorbato 20, glicerina, propilenglicol, sacarina sódica, emulsión de silicona, crospovidona, sabor vainilla, goma xanthan, agua purificada c.s.p 100 ml.

Medicamento Libre de Gluten

