

KRITEL® GOTAS LAXANTES

PICOSULFATO DE SODIO 750 mg/100 ml

ACCIÓN:

Laxante.

PARA QUÉ SE USA KRITEL GOTAS:

KRITEL Gotas está indicado para el alivio de los síntomas de constipación o estreñimiento, en tratamientos de corta duración, cuando las medidas higiénico / dietéticas han fracasado.

CÓMO SE USA KRITEL GOTAS:

Adultos y niños mayores de 12 años: 8 a 12 gotas (4 a 6 mg) en un vaso con un poco de agua, una vez al día, preferentemente por la noche antes de acostarse.

KRITEL actúa por la mañana al despertarse.

Puede utilizarse con agua, jugos, leche o bebidas saborizadas.

Dosis máxima: 12 gotas = 6 mg de picosulfato de sodio.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO:

Qué personas no pueden recibir KRITEL Gotas:

Niños menores de 12 años, salvo expresa indicación médica.

No use este medicamento si Usted es alérgico a alguno de sus componentes o si tiene náuseas, vómitos, calambres, dolor de estómago o de la parte inferior del abdomen, que puedan indicar apendicitis u otros problemas que puedan requerir cirugía.

No debe tomar laxantes si sufre alguna enfermedad intestinal inflamatoria, si presenta un cuadro de obstrucción intestinal, dolor abdominal no diagnosticado, deshidratación grave o si observa sangre en la materia fecal.

Es conveniente que las personas mayores de 65 años consulten a su médico antes de tomar este medicamento.

Si Usted recibe algún otro medicamento para alguna enfermedad crónica, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO:

El uso prolongado de laxantes puede ocasionar una situación de dependencia a los mismos. Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como dolor abdominal de tipo cólico, malestar abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas. En todos los casos desaparecen al suspender el tratamiento.

KRITEL Gotas contiene el conservante metilparabeno que puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas).

Si Usted toma al mismo tiempo diuréticos, puede suceder que aumente el riesgo de desequilibrio electrolítico, es decir pérdida de agua y electrolitos, por lo que debe consultar a su médico.

Suspenda su uso y consulte a su médico si la constipación persiste por más de 3 días o empeora.

QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD QUE LA NECESARIA:

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de intoxicaciones:

Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
Gallo 1330, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos: (011) 4962-6666 / 2247.

Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, U.B.A.:
Paraguay 2155, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: (011) 5950-9500.

Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas:
Presidente Illia 999, Haedo.
Teléfonos: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Niños de La Plata:
Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.
Teléfonos: 0800 222-9911 ó
(0221) 451-5555.

Última revisión del prospecto aprobada por A.N.M.A.T.:
Agosto 2012

TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA:

Atención al Cliente:
(011) 4304-4524 y líneas rotativas.

ANMAT Responde 0800 333 1234

PRESENTACIONES

Frascos goteros con tapa de seguridad conteniendo 20 ml.
Venta libre. Industria Argentina.

Otras formas farmacéuticas:
KRITEL Emulsión frascos x 240 ml
KRITEL Enema pomos x 135 ml
KRITEL Chicles x 6 sabor menta

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 33.380.
Directora Técnica:
Farmacéutica Filomena Freire.

Conservar en lugar fresco a menos de 30 °C, al abrigo de la luz.
Como todo medicamento, se aconseja mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Si el cierre de seguridad está abierto no use este medicamento.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S. A.
Virrey Cevallos 1623/25/27
C1135AAI Ciudad de Bs. Aires.
Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas.

KRITEL® GOTAS LAXANTES



M&E

PICOSULFATO DE SODIO

QUÉ CONTIENE KRITEL GOTAS:

Cada 100 ml contiene:

Picosulfato de sodio 750 mg

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR
Eficacia y seguridad para recomendar

Excipientes: metilparabeno, sorbitol al 70%,
agua purificada c.s.

Medicamento Libre de Gluten

