

# OPOCARBON® COMPRIMIDOS

FTALILSULFATIAZOL - NEOMICINA

CARBÓN ACTIVADO - CAOLÍN

## ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antidiarreico. Antiséptico y adsorbente intestinal.

## INDICACIONES:

Diarreas de cualquier etiología. Diarreas virales. Diarrea estival. Enterocolitis. Diarrea del viajero. Diarrea por cambio de hábitos alimentarios. Diarreas de origen infeccioso por ingestión de alimentos en mal estado, frutas y verduras mal lavadas o aguas contaminadas. Antisepsia intestinal preoperatoria.

## POSOLOGÍA:

Salvo mejor indicación profesional se recomienda:

**Adultos y niños mayores de 12 años:** Dos comprimidos juntos cada cuatro a seis horas o después de cada deposición diarreica. Desaparecidos los síntomas, se recomienda continuar el tratamiento durante dos días más disminuyendo la dosificación a un comprimido cada cuatro a seis horas.

**Niños mayores de dos años:** Un comprimido cada cuatro a seis horas. Para facilitar la ingesta, el comprimido puede partirse o molerse, manteniendo inalterables sus cualidades terapéuticas.

## CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad o alergia conocida a alguno de sus componentes. Si se observara sangre en las deposiciones no inicie tratamientos antidiarreicos sin estricto control médico.

## EFFECTOS COLATERALES:

Constipación o bolo fecal pueden presentarse por sobredosificación de antidiarreicos o adsorbentes intestinales. Tratamientos prolongados pueden producir: cefalea, anorexia, hipoprotrombinemia o sobreinfección intestinal por Cándida.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

En el tratamiento de la diarrea es fundamental una adecuada rehidratación.

Luego de 24 / 48 horas, si la respuesta no es satisfactoria o si aparecen signos de deshidratación, consulte al médico para tomar otras medidas terapéuticas.

En caso de aparecer erupción cutánea el tratamiento con OPOCARBON debe suspenderse.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Al igual que con todos los antidiarreicos o adsorbentes, es conveniente que la ingesta de OPOCARBON se realice con un intervalo de dos o tres horas antes y/o después de la ingesta oral de otros medicamentos tales como: digoxina, lincomicina, promazina o pseudoefedrina, para no disminuir su velocidad de absorción.

## SOBREDOSIFICACIÓN:

En caso de sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

**Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:**

Gallo 1330, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos: (011) 4962-6666 / 2247.

**Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, U.B.A.:**

Paraguay 2155, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfono: (011) 5950-9500.

**Hospital Nacional Profesor Dr. Alejandro Posadas:**

Presidente Illia 999, Haedo.

Teléfonos: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

**Hospital de Niños de La Plata:**

Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.

Teléfonos: 0 800 222-9911 / (0221) 451-5555.

## OPOCARBON® COMPRIMIDOS

FTALILSULFATIAZOL - NEOMICINA

CARBÓN ACTIVADO - CAOLÍN

### PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo 20 comprimidos.

Venta bajo receta. Industria Argentina.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 28.769.

Directora Técnica: Farmacéutica Filomena Freire.

Elaborado en: Virgilio 844, Buenos Aires.

Como todo medicamento, se aconseja mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Conservar a menos de 30°C en su envase original.

Última revisión del prospecto aprobada por A.N.M.A.T.:

Febrero / 1999

**Laboratorios MONSERRAT Y ECLAIR S.A.**

Virrey Cevallos 1623/25/27

C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Teléfonos y Fax: (011) 4304-4524 y líneas rotativas.

# OPOCARBON® COMPRIMIDOS



M&E

LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR  
*Eficacia y seguridad para recomendar*

FTALILSULFATIAZOL - NEOMICINA - CARBÓN ACTIVADO - CAOLÍN

### FÓRMULA:

Cada comprimido contiene:

**Ftalilsulfatiazol** 500 mg

**Neomicina** 50 mg (como sulfato)

**Carbón activado** 150 mg

**Caolín** 150 mg

Excipientes: croscarmelosa sódica, gelatina, estearato de magnesio, lactosa c.s.

Medicamento Libre de Gluten

