

MICOCLIN®

CREMA POLVO LOCIÓN (Spray)

CLOTRIMAZOL 1%

Lea con cuidado esta información antes de utilizar este medicamento

ACCIÓN:

Antimicótico de uso local y amplio espectro de acción: elimina hongos de la piel.

PARA QUÉ SE USA MICOCLIN:

El clotrimazol está indicado para el tratamiento de los hongos del cuerpo y de los pies (pie de atleta).

Estas afecciones, generalmente se manifiestan a través de síntomas tales como: picazón, ardor, mal olor, sequedad, despellejamiento, sarpullido y ulceración.

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR MICOCLIN:

No use este medicamento si Usted es alérgico a alguno de sus ingredientes.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO?

No lo aplique en cuero cabelludo, boca, ojos ni genitales.

Adultos mayores: este producto puede ser utilizado en personas mayores de 60 años sin modificar las dosis y/o el tiempo de tratamiento.

Si Usted está utilizando algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Mientras Usted usa este medicamento pueden aparecer efectos no esperados. Dígale a su médico si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o no desaparece: ardor, irritación, hinchazón, inflamación o enrojecimiento de la piel en la zona de aplicación, picazón localizada o generalizada. En estos casos suspenda el uso de este medicamento y consulte a su médico.

Si los síntomas por los cuales está utilizando **MICOCLÍN/CLOTRIMAZOL** persisten por más tiempo que los indicados en *"¿Cómo se usa este medicamento?"*, suspenda su uso y consulte a su médico.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Para usar **MICOCLÍN**, en cualquiera de sus formas farmacéuticas, primero limpie y seque bien la zona afectada y luego aplique sobre la misma **MICOCLÍN**.

Una vez aplicados **MICOCLIN Crema** o **MICOCLIN Polvo**, es conveniente frotar suavemente hasta que penetre el medicamento en la piel o se perciba su desaparición de la superficie.

Después de aplicar este medicamento, lávese inmediatamente las manos para así evitar transmitir la infección.

MICOCLÍN Spray se aplica rociando brevemente sobre el área afectada hasta cubrirla totalmente. Si se aplica sobre el cuerpo o sobre el pie, se recomienda esperar unos minutos a que la solución se evapore antes de vestirse o calzarse.

Si sus síntomas no mejoran, suspenda la aplicación y consulte con su médico.

MICOCLIN Crema se utiliza preferentemente en rostro, cuerpo, brazos, axilas, pliegues submamaros, piernas, pliegues entre los dedos del pie y zona inguinal.

MICOCLIN Polvo se utiliza preferentemente en aquellos lugares en que debe evitarse la humedad por transpiración como axilas, pliegues submamaros, zona inguinal, pliegues entre los dedos del pie y pie de atleta. En caso de hongos en los pies se recomienda aplicarlo diariamente en el interior de medias, zapatos, botas y muy especialmente en el calzado deportivo.

MICOCLIN Spray se utiliza preferentemente en grandes superficies corporales o en aquellos lugares de difícil acceso: pecho, espalda, brazos, piernas, axilas, pliegues entre los dedos del pie y pie de atleta.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

En general la duración del tratamiento es la siguiente:

MICOCLIN®

CREMA POLVO LOCIÓN (Spray)
CLOTIRIMAZOL 1%

Pie de atleta:

Aplique **MICOCLIN** una vez al día durante una semana.

Manos, pies y axilas:

Aplique **MICOCLIN** una vez al día durante una a dos semanas. En el caso de hongos en el pie asegúrese de aplicar correctamente entre los dedos del pie.

Pecho, espalda, brazos y piernas:

Aplique **MICOCLIN** una vez al día durante una a dos semanas.

Generalmente a los pocos días del inicio del tratamiento con **MICOCLIN** los síntomas suelen disminuir, continúe normalmente la aplicación por el tiempo recomendado como se indica más arriba para cada afección.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, SI USÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA O EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

Centros de intoxicaciones:

Htal. de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez:
Gallo 1330, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfonos: (011) 4962-6666 / 2247.

Cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina, U.B.A.:
Paraguay 2155, Ciudad de Buenos Aires.
Teléfono: (011) 5950-9500.

Htal. Nac. Prof. Dr. Alejandro Posadas:
Presidente Illia 999, Haedo.
Teléfonos: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

Hospital de Niños de La Plata:
Calle 14 entre 65 y 66, La Plata.
Teléfono: (0221) 451-5555.

Tiene usted alguna pregunta:

(011) 4304-4524 y líneas rotativas
ANMAT Responde 0800 333 1234

PRESENTACIONES

Crema: pomo conteniendo 20 g.
Polvo: talquera conteniendo 30 g.
Loción (Spray): frasco/ dosificador conteniendo 60 ml.
MICOCLIN Polvo elaborado en:
Galicia 2652, Ciudad de Buenos Aires
Venta libre. Industria Argentina

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Cert. N° 41.765.
Directora Técnica:
Farmacéutica Filomena Freire.

N° de Registro Sanitario en Bolivia:
MICOCLIN Crema: II-52142/2014
MICOCLIN Spray: II-50859/2013
Importado y Distribuido en Bolivia por:
Importadora y Distribuidora SANAMEDIC

MODO DE CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco a menos de 30 °C. Si el cierre de seguridad está abierto no use este medicamento.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

Última revisión del prospecto aprobada por A.N.M.A.T.: Septiembre 2014

LABORATORIOS
MONSERRAT Y ECLAIR S. A.
Virrey Cevallos 1623/25/27
C1135AAI Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfonos y Fax: +54 11 4304-4524 y líneas rotativas



MICOCLIN® ANTIMICOTICO

M&E

CLOTIRIMAZOL

Eficacia y seguridad para recomendar LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR

QUÉ CONTIENE MICOCLIN CREMA:

Cada 100 gramos contiene:

CLOTIRIMAZOL 1 gramo

Excipientes: cremophor A 6, cremophor A 25, alcohol cetosteárilico, butilparabeno, metilparabeno, propilglicol, propilparabeno, vaselina líquida, agua purificada c.s.p. 100 g.

QUÉ CONTIENE MICOCLIN LOCIÓN (SPRAY):

Cada 100 mililitros contiene:

CLOTIRIMAZOL 1 gramo

Excipientes: polietilenglicol 400, miristato de isopropilo, alcohol isopropílico c.s.p. 100 ml

QUÉ CONTIENE MICOCLIN POLVO:

Cada 100 gramos contiene:

CLOTIRIMAZOL 1 gramo

Excipientes: aerosil, estearato de magnesio, talco irradiado c.s.p. 100 g.