

KIPERGRIP®Venta Libre
Industria ArgentinaCompridos
Recubiertos

16

Medicamento
Libre de Gluten**KIPERGRIP®****QUÉ ACCIÓN TIENE KIPERGRIP**

KIPERGRIP es descongestionante, calma los dolores de cabeza, musculares y articulares, baja la fiebre y calma la tos.

PARA QUÉ SE USA KIPERGRIP

KIPERGRIP está indicado para el alivio sintomático de los procesos que cursan con fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares y articulares, congestión mucosa de las vías aéreas (congestión nasal, congestión faríngea y bronquial). KIPERGRIP está indicado para el alivio de los estados gripales y/o resfríos: para reducir la fiebre, para el alivio sintomático de dolores leves y moderados, para descongestionar la nariz y calmar la tos.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER**ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO**

Emplear con precaución si Usted padece afecciones del corazón, diabetes, enfermedades de próstata o presión arterial alta. Si está tomando algún otro medicamento o si consume 3 o más vasos diarios de bebidas alcohólicas, consulte con su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si Usted está tomando al mismo tiempo:
* Anticonvulsivantes (medicamentos para la epilepsia)
* Anticonceptivos orales * Antibióticos * Antiespasmódicos (medicamentos para cólicos o retortijones) * Diuréticos
* Antinauseosos * Anticoagulantes * Antidepresivos.

QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR KIPERGRIP

No use este medicamento: si Usted sabe que es alérgico a alguno de los componentes de la fórmula. * Si la aspirina u otros analgésicos/antiinflamatorios le provocan asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. * Si padece úlcera péptica activa o antecedentes de úlcera recurrente. * En caso de enfermedad de la glándula tiroides, enfermedad hepática, hepatitis, trastornos renales o alcoholismo. * Si anteriormente Usted presentó reacciones cutáneas serias por paracetamol.

QUÉ CUIDADOS DEBO TENER**MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO**

Evite el consumo de bebidas alcohólicas. Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como vómitos, malestar gástrico, náuseas, sudoración, dificultad para respirar, aumento de la presión arterial, insomnio, excitación, nerviosismo, reacciones en la piel como urticaria, enrojecimiento, prurito, etc. Si algo de esto ocurre o si se le presenta alguna reacción cutánea como urticaria, eritema o ampollas o algún otro síntoma no descrito anteriormente, suspenda la medicación y consulte rápidamente a su médico.

CÓMO SE USA KIPERGRIP

Adultos y adolescentes mayores de 16 años: 1 comprimido cada 8 hs. **Dosis máxima:** tres comprimidos por día. Si los síntomas de dolor o fiebre persisten por más de 48 o 72 horas consulte con su médico.

QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD QUE LA NECESARIA:

Llame a un centro de intoxicaciones o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

- * Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- * Hospital G. de Ag. J.A. Fernández (011) 4808-2655/4801-7767
- * Hospital Nac. Prof. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777
- * Hosp. de Niños de La Plata: 0800 222 9911 / (0221) 451-5555

- * Si padece glaucoma (aumento de la presión intraocular).
- * Si padece agrandamiento de la próstata con dificultad para orinar. * Si padece alguna enfermedad del corazón: taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho o presión alta no controlada. * Niños menores de 16 años.

Si Usted está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿Tiene usted alguna pregunta? ANMAT Responde 0800 333 1234
Atención a Clientes: 4304-4524 y líneas rotativas

KIPERGRIP®**BUTETAMATO PARACETAMOL FENILEFRINA CAFEÍNA****KIPERGRIP BAJA LA FIEBRE, DESCONGESTIONA, CALMA LA TOS
CALMA LOS DOLORS DE CABEZA, MUSCULARES Y ARTICULARES**

M&E

16 Compridos
Recubiertos

M&E

ABRA
POR AQUÍ**1 comprimido cada 8 horas****Alivia los estados gripales y/o resfríos**VL Venta
LibreIndustria
Argentina

Lea detenidamente esta información antes de tomar este medicamento. Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar a menos de 30°C en su envase original.

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: Enero 2015.

Dir. Téc.: Farmacéutica Filomena Freire. E.M.A.M.S.
Cert. N° 47.444. Elaborado en: Galicia 2652 CABA

M&E

QUÉ CONTIENE KIPERGRIP: Cada comprimido recubierto contiene: Paracetamol 500 miligramos, Butetamato 40 miligramos, Fenilefrina 8 miligramos, Cafeína 30 miligramos

Sel. celulosa microcristalina, anhídrido silícico coloidal, crosscarmelosa sódica, estearato de magnesio, dióxido de titanio, hidroxipropilmetilcelulosa E 15, povidona, color pardo 412 B, polietilenglicol 6000, propilenglicol.

Lab. MONSERRAT Y ECLAIR S.A. Virrey Cevallos 1623/25/27
C1135AAL Ciudad de Buenos Aires TeleFax: (011) 4304-4524



7 179533 4000446